



<https://printo.it/pediatric-rheumatology/BD/intro>

ড্রাগ থেরাপি

বিরণ 2016

সালফাসালাজনি

বরণা

সালফাসালাজনি এন্টবিকোটেরিয়াল এবং এন্টহিনফলামটোরি ঔষধ এর সমন্বয়ে তৈরী। ইহা অনেকে বছর আগে থেকেই ব্যবহৃত হয়ে আসছে যখন পূর্ণ বয়স্ক রডিমাটয়েডে আথ্রাপাইটিস কে একটি সংক্রামক রোগ হিসেবে বিবেচনা করা হতো। এই ধরনের পরে সালফাসালাজনি এর ব্যবহার এর যৌক্তিকতা ভুল প্রমাণিত হয়েছে। কিছু বাত রোগের ক্ষেত্রে সালফাসালাজনি এর কার্যকারিতা দেখা গেছে। সাথে সাথে কিছু রোগে ক্ষেত্রে অন্তর্কর্মকি পরদাহ দেখা যায় সন্ধানও কাজ করে।

ঔষধ এর মাত্রা

৫০মিগ্রাম/কজে/প্রতিদিন মুখে খাবে সর্বোচ্চ ২ গ্রাম/প্রতিদিন

পারশ্বপ্রতিক্রিয়া

পারশ্ব প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায় না এমন নয় এবং মাঝে মাঝে রক্ত পরীক্ষার প্রয়োজন হয়। যমেন-পাকস্থলী এবং রক্তের সমস্যা (বমি বমিভাব, বমিহওয়া, উদরাময়), চামড়ায় র্যাশ, চুলকানি, যকৃতের সমস্যা, রক্তকনিকা কমে যাওয়া, সিরাম ইমডিনে গলে বাউলনি কমে যাওয়া।

এই ঔষধ সিসিটমেকি জে.আই.এ অথবা জুভনোইল এস.এল.ই তে ব্যবহার করা যাবে না কারণ এতে রোগ বেড়ে যাবে অথবা ম্যাক্রোয়াজে একটিশেন সনিড্রমে কমে করবে।

প্রধান প্রধান রডিমাটিকি রোগসমূহ

জোআইএ (এন্থসোসাইটিস রলিটেডে আর্থ্রাইটিস)