



SHARE



PREs
paediatric
rheumatology
european
society

<https://printo.it/pediatric-rheumatology/BD/intro>

ড্রাগ থেরাপি

বিরণ 2016

সাইক্লোসেপারিন-এ

বরণা

এটা ইমিউনোসাপ্রসেডি ঔষধ প্রাথমিক ভাবে এটা যসেকল রোগীদের অঙ্গ প্রতিস্থাপন হতে তাদের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হতে। কনিতু এখন রডিমাটিক রোগের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হচ্ছে। ইহা শ্বতে রক্ত কনিকা কে প্রতিহিত করে যা ইমিউনোসাপ্রসেপনস এর জন্য দরকারী

মাত্রা

সরিপ অথবা বড়ি, ৩-৫ মগ্নাম/কজে/প্রতিদিন দুইভাবে দয়ো যাবে।

পারশ্বপ্রতিক্রিয়া

পরশ্বপ্রতিক্রিয়া সাধারণত বেশী দেখা যায়, বেশী মাত্রায় হয় এবং তখন ঔষধ বন্ধ করতে হয়। তা হল কডিনীর ক্ষতি, এক রক্ত চাপ, লভিরের সমস্যা, মাড়ি ফুলে যাওয়া, অতিরিক্ত লোম, বমি বমিভাব ও বমি হওয়া।

তাই সাইক্লোসেপারিন দেওয়ার পর নিয়মিত ক্লিনিক্যাল এবং ল্যাবরটেরী পরীক্ষা করতে হবে পরশ্বপ্রতিক্রিয়া বোঝার জন্য বাচ্চাদের বাড়িতে নিয়মিত রক্তচলা পরীক্ষা করতে হবে।

প্রধান শিশু রডিমাটিক রোগ যাত্রে দয়ো যায়।

ম্যাক্রোফজে একটভিশেন সনিড্রোম

জুভনোইল ডার্মাটোমায়োসাইটিস