



SHARE



PREs
paediatric
rheumatology
european
society

<https://printo.it/pediatric-rheumatology/BD/intro>

ড্রাগ থেরাপি

ববিরণ 2016

লফিলে নো নামাইড

বরণনা

লডিফে নামাইড একটা বিকল্প ঔষধ, সসেব রোগীদের জন্য যাদের উপর মথে ট্রাকস্টে কাজ করনা। যাই হোক, শিশু বাতরোগে জন্য এই ঔষধ এর অভিজ্ঞতা বরিল এবং এই ঔষট্ শিশু বাত রোগ রোগে ক্ষেত্রে ব্যবহারে জন্য কর্তৃপক্ষে অনুমতিনেই।

ঔষধ এর মাত্রা

যসেব শিশুদের ওজন ২০ কজেরি কম তারা প্ৰতিদিনে ১০০ মগ্গিগ্রাম লডিফে নামাইড এক দিনে জন্য খতে পারবে, পরবর্তীতে ১০ মগ্গিগ্রাম একদিন পর পর খতে পারবে। যসেব শিশুদের ওজন ২০-৪০ কজেরি তারা ১০০ মগ্গিগ্রাঃ লডিফে নামাইড দুদিন, পরবর্তীতে ১০ মগ্গিগ্রাম প্ৰতিদিনে খতে পারবে। যসেব শিশুদের ওজন ৪০ কজেরি বেশী, তারা ১০০ মগ্গিগ্রাঃ লফিলে নো নামাইড তনি দিনে জন্য খতে পারবে, পরবর্তীতে প্ৰতিদিনে ২০ মগ্গি গ্রাম।

পারশ্বপ্ৰতিক্ৰিয়া

যহেতু লডিফে নামাইড গৰ্ভাবস্থায় ভ্ৰূণের জন্য ক্ষতিকারক তাই গৰ্ভাবস্থায় এই ঔষধ ব্যবহার করা যাবে না এবং অবশ্যই এই ঔষধ চলাকালীন সময়ে জন্মনয়িন্ত্রন ব্যবস্থ গ্রহন করতে হবে।

কোন কোন শিশু রডিমাটিক রোগে ক্ষেত্রে দেয়া যাবে

শিশু বাত রোগ