



<https://printo.it/pediatric-rheumatology/BD/intro>

## পফিাপা

ববিরণ 2016

পফিাপা ক'?

ইহা ক'?

পফিাপা এর পরেইডকি ফভোর এ্যাডনোইটসি ফ্যারনিজাইটসি এ্যাপথেসিস অরথ (Periodic Fever Adenitis Pharyngitis Aphthosis) এটা একটা মডেকিলে শব্দ যাত করে জ্বর, ঘাড়ের লসিকা গ্রন্থি ফুলে যাওয়া, গলায় ব্যাথা, মুখে ঘা, পফিাপা সাধারণত কম বয়সী শিশুদের যা ৫ বছরে আগরে শিশুদের হয়। রোগটা সাধারণত দীর্ঘময়াদী কনিতু কম ভয়াবহ যার সময়ে সাথে উন্নত হওয়ার প্রবনতা থাকে। রোগটা প্রথম চহিনতি হয় ১৯৪৭ সালে এবং মারসাল'স সনিড্রম (Marshall's syndrome) বলা হতো।

ইহা কতটা সাধারন ?

রোগটা কতটা সাধারন তা জানা যায় নিকনিতু ধারনার চয়ে বশী হয়।

১.৩ এই রোগের কারনগুলো ক'ক'?

এই রোগের কারন জানা যায় নাই। জ্বরের সময় রোগ প্রতরিতাধ কষমতা সক্রয়ি হয়। এই সক্রয়িতা প্রদাহজনক প্রতিক্রিয়া দেখায় এবং গলায় ও মুখে প্রদাহ করে। এই প্রদাহ নজি নজি ভাল হয়ে যায় এবং দুইটা ঘটনার মাঝে প্রদাহের কোন লক্ষণ থাকনো।

এটা ক'বংশগত ?

পারবারিক কনিতু কোন জন্মগত কারন এখন পর্যন্ত পাওয়া যায়নি।

এটা ক'সংক্রামক ?

এটা কোন সংক্রামক রোগ নয় এবং ছোয়াচোপে নয়। তবে ইনফেকশন হয়তো আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা বাড়ায়।

---

### ১.৬ প্রধান লক্ষণগুলো কী কী?

প্রধান লক্ষণগুলো হলো জ্বর, তার সাথে গলায় প্রদাহ, মুখে ঘা অথবা সারভাইকলে লসকিগ্নন্থি বড় হয়ে যাওয়া জ্বরের প্রকোপটা হঠাৎ করে শুরু হতে পারে এবং ৩ থেকে ৬ দিন পর্যন্ত থাকতে পারে। এই সময় শিশুটি দেখতে খুবই অসুস্থ মনে হয় এবং কমপক্ষে উপরে বর্ণিত ৩ টার মধ্যে ১টা লক্ষণ থাকতে পারে। জ্বরটা প্রতি ৩-৬ সপ্তাহ পরপর আসতে পারে কখনও কখনও খুবই নিয়মিত বরিতিতে আসতে পারে। জ্বরের মধ্যবর্তী সময়ে বাচ্চাটা ভাল থাকে এবং স্বাভাবিক কাজকর্ম করে।

### এটা কী সব বাচ্চাদের একই হয় ?

উপরে বর্ণিত প্রধান উপসর্গগুলো আক্রান্ত সব শিশুদের পাওয়া যায়। তাছাড়া কিছু শিশুদের কিছু কম আকারে রোগটা হয় যখনে অন্য শিশুদের আরো কিছু বাড়তি উপসর্গ যমেন-অবম্বাদ, গীড়া ব্যথা, পটে ব্যথা মাথা ব্যথা বমি অথবা পাতলা পায়খানা হতে পারে।