



<https://printo.it/pediatric-rheumatology/BD/intro>

পফিাপা

ববিরণ 2016

পফিাপা কি?

ইহা কি?

পফিাপা এর পরেইডকি ফভোর এ্যাডনোইটসি ফ্যারনিজাইটসি এ্যাপথেসিসি অরথ (Periodic Fever Adenitis Pharyngitis Aphthosis) এটা একটা মডেকিলে শব্দ যাত করে জ্বর, ঘাড়ের লসিকা গ্রন্থি ফুলে যাওয়া, গলায় ব্যাথা, মুখে ঘা, পফিাপা সাধারনত কম বয়সী শিশুদরে যা ৫ বছররে আগরে শিশুদরে হয়। রোগটা সাধারনত দীর্ঘময়োদী কনিতু কম ভয়াবহ যার সময়রে সাথে উন্নত হওয়ার প্রবনতা থাকে। রোগটা প্রথম চহিনতি হয় ১৯৪৭ সালে এবং মারসাল'স সনিড্রম (Marshall's syndrome) বলা হতো।

ইহা কতটা সাধারন ?

রোগটা কতটা সাধারন তা জানা যায় নিকিনিতু ধারনার চয়েে বেশী হয়।

১.৩ এই রোগরে কারনগুলো কি কি?

এই রোগরে কারন জানা যায় নাই। জ্বররে সময় রোগ প্রতরিরোধ কষমতা সক্রয়ি হয়। এই সক্রয়িতা প্রদাহজনক প্রতিক্রয়িয়া দেখোয় এবং গলায় ও মুখে প্রদাহ করে। এই প্রদাহ নজিে নজিে ভাল হয়ে যায় এবং দুইটা ঘটনার মাঝে প্রদাহরে কোন লক্ষণ থাকনো।

এটা কি বংশগত ?

পারবারিকি কনিতু কোন জন্মগত কারন এখন পর্যন্ত পাওয়া যায়নি।

এটা কি সংক্রামক ?

এটা কোন সংক্রামক রোগ নয় এবং ছোয়াচোে নয়। তবে ইনফেকশন হয়তো আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা বাড়ায়।

১.৬ প্রধান লক্ষণগুলো কীকি?

প্রধান লক্ষণগুলো হলো জ্বর, তার সাথে গলায় প্রদাহ, মুখে ঘা অথবা সারভাইকলে লসকিগ্নন্থি বড় হয়ে যাওয়া জ্বরেরে পরকে ১পটা হঠাৎ করে শুরু হতে পারে এবং ৩ থেকে ৬ দিনি পরযন্ত থাকতে পারে। এই সময় শিশুটিদিখেতে খুবই অসুস্থয় মনে হয় এবং কমপক্ষে উপরে বরণতি ৩ টার মধ্যে ১টা লক্ষণ থাকতে পারে। জ্বরটা প্রতী ৩-৬ সপ্তাহ পরপর আসতে পারে কখনও কখনও খুবই নিয়মতি বরিততি আসতে পারে। জ্বরেরে মধ্যবর্তী সময়ে বাচচাটা ভাল থাকে এবং স্বাভাবিকি কাজকর্ম করে।

এটা কিসব বাচচাদরে একই হয় ?

উপরে বরণতি প্রধান উপসর্গগুলো আক্রান্ত সব শিশুদরে পাওয়া যায়। তাছাড়া কছু শিশুদরে কছু কম আকারে রোগটা হয় যখনে অন্য শিশুদরে আরো কছু বাড়তি উপসর্গ যমেন-অবষাদ, গীড়া ব্যথা, পটে ব্যথা মাথা ব্যথা বর্মি অথবা পাতলা পায়খানা হতে পারে।