



<https://printo.it/pediatric-rheumatology/BD/intro>

ক্যান্ডল

বিরণ 2016

রোগ নির্ণয় এবং চিকিৎসা

এই রোগ কভাবে নির্ণয় সনাক্ত করা হয়?

প্রথমতই বাচ্চার লক্ষণ সমূহ দেখে ক্যান্ডল সম্পর্কে ধারণা করা হয়। জনিগত বিশ্লেষণ এর মাধ্যমতই কবেল ক্যান্ডল রোগটিকে সনাক্ত করা যায়। ক্যান্ডল নশিচিতিভাবে নির্ণয় হয় তখনই যখন দুটো জনিই মডিটে থাকে। জনিগত বিশ্লেষণ সব তৃতীয় স্তরে সবার দান কারী নাও থাকতে পারে।

কি কি গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা আছে?

রক্ত পরীক্ষা যমেন-ই এস আর, সআরপি, রক্ত কণিকা সমূহের সংখ্যা, ফব্রিনিটেজনে করা হয় রোগে প্রদাহের মাত্রা এবং রক্ত শূন্যতা দেখার জন্য। লভির আক্রান্ত কনি দেখার জন্য লভির এর পরীক্ষা করা হয়। পর্যায় ক্রমে এই পরীক্ষাগুলো বারবার করা হয়, যে গুলো স্বাভাবিক হয়েছে কনি বা স্বাভাবিকের কাছাকাছি এসছে কনি। জনেটেকি এনালাইসিসের জন্য অল্প পরিমাণ রক্তের দরকার হয়।

এটা কি চিকিৎসা প্রতিকার করা সম্ভব?

ক্যান্ডল এর সম্পূর্ণ নিরাময় সম্ভব নয় কারণ এটা বংশগত/জনিগত

চিকিৎসা কি কি?

ক্যান্ডলে সনিড্রোম এর জন্য কোন কার্যকারী চিকিৎসা নেই। উচ্চমাত্রায় স্টেরয়েডে (১-২ মগিগ্রাঃ প্রতি কিজি ওজনরে জন্য প্রতিদিন) ব্যবহারে কিছু উপসর্গের উপসম হয় যমেন-চামড়ার দানা, জ্বর, গড়া ব্যাথা। কিন্তু দানা মাত্রা কমানো শুরু হয় তখনই উপসর্গ সমূহ কপিুনরায় ফিরে আসে। টপ্রিনএফ আলফা বাধা দানকারী ঔষধ এবং ওখ-১ (এনাকনিরা) ব্যবহারে কিছু রোগীর ক্ষেত্রে সাময়িক উন্নতি গিয়েছে অন্যদরে ক্ষেত্রে বরং বড়েছে। টসলিটেজুমাভ ব্যবহারে কিছু উন্নতি দেখতে পাওয়া যায়। পরীক্ষামূলক ভাবে জ্যাক কাইনজে বাধা দানকারী ঔষধ টফসিটিনিডি ব্যবহারিত হয়ে চলছে।

ঔষধের পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া গুলো কী?

করটকি স্ট্রেয়েডের সম্ভাব্য পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া গুলো হলো ওজন বড়ে যাওয়া, মুখ ফুলে যাওয়া, মনে ভাব উঠানামা করা। অনেকে দীর্ঘ সময় ধরে স্ট্রেয়েডে ব্যবহার করলে শারীরিক বৃদ্ধি কমে যায়, হাড় ক্ষয় হয়ে যায়, উচ্চ রক্তচাপ এবং ডায়াবেটিস হতে পারে।

করটকি স্ট্রেয়েডের সম্ভাব্য পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া গুলো হলো ওজন বড়ে যাওয়া, মুখ ফুলে যাওয়া, মনে ভাব উঠানামা করা। অনেকে দীর্ঘ সময় ধরে স্ট্রেয়েডে ব্যবহার করলে শারীরিক বৃদ্ধি কমে যায়, হাড় ক্ষয় হয়ে যায়, উচ্চ রক্তচাপ এবং ডায়াবেটিস হতে পারে।

কত দিন চিকিৎসা করতে হবে?

চিকিৎসা চলবে সারাজীবন

অগত্যানুগত কি বা পরস্পরক চিকিৎসাগুলো কী?

ক্যান্ডল সনিড্রোম এর ক্ষেত্রে এধরনের কোন চিকিৎসার কোন প্রমাণ পাওয়া যায়নি।

কতদিন পরস্পর চকে-আপ করতে হবে?

এই রোগে আক্রান্ত বাচ্চাদেরকে অসুখটিনিয়ন্ত্রনরে রাখার এবং ঔষধেরে মাত্রা ঠিক রাখার জন্য নিয়মতি (বছতে কমপক্ষে ৩ বার) শিশু বারজ্বর বিশেষণরে কাছনে নিয়ে যতে হবে। বছতে অন্তত দুবার রক্ত ও প্রসাব পরীক্ষা করতে হবে।

কতদিন পর্যান্ত এই রোগ থাকবে?

ক্যান্ডল একটা জীবনব্যাপী অসুখ। যাহোক, অসুখেরে মাত্রা উঠা নামা করতে পারে।

দীর্ঘময়াদী পরনিত কী?

আয়ু কমে যতে পারে, বিভিন্ন অঙ্গে পরদাহরে ফল হিসেবে মৃত্যুও হতে পারে। যহেতে আক্রান্ত শিশুদেরে শিশুদেরে কর্মক্ষমতা কমে যায়। জ্বর, ব্যাথা এবং ঘনঘন মারাত্মক পরদাহরে কারণে জীবনযাপনরে গুণগত মান কমে যায়।

সম্পূর্ণ নিরাময় কিসম্ভব?

না, সম্ভব নয়, কেননা এটা জনিগত রোগ