



<https://printo.it/pediatric-rheumatology/BD/intro>

ক্যান্ডল

ববিরণ 2016

রোগ নির্ণয় এবং চিকিৎসা

এই রোগ কভাবে নির্ণয় সনাক্ত করা হয়?

প্রথমতই বাচ্চার লক্ষণ সমূহ দেখে ক্যান্ডল সম্পর্কে ধারণা করা হয়। জনিগত বশ্লিষেন এর মাধ্যমতই কবেল ক্যান্ডল রোগটিকে শনাক্ত করা যায়। ক্যান্ডল নশ্চিতভাবে নির্ণয় হয় তখনই যখন দুটো জনিই মডিটে থাকে। জনিগত বশ্লিষেন সব তৃতীয় স্তরে সবা দান কারী নাও থাকতে পারে।

ককি গুবুত্বপূরণ পরীক্ষা আছে?

রক্ত পরীক্ষা যমেন-ই এস আর, সআরপি, রক্ত কণিকা সমূহের সংখ্যা, ফব্রিনিটোজনে করা হয় রোগে প্রদাহের মাত্রা এবং রক্ত শূন্যতা দেখার জন্য। লভির আকরান্ত কনি দেখার জন্য লভির এর পরীক্ষা করা হয়। পর্যায় ক্রমে এই পরীক্ষাগুলো বারবার করা হয়, যে গুলো স্বাভাবিক হয়েছে কনি বা স্বাভাবিকের কাছাকাছি এসছে কনি। জনেটেকি এনালাইসিসেরে জন্য অল্প পরিমান রক্তেরে দরকার হয়।

এটা ককি চিকিৎসা প্রতিকার করা সম্ভব?

ক্যান্ডল এর সম্পূর্ণ নিরাময় সম্ভব নয় কারণ এটা বংশগত/জনিগত

চিকিৎসা ককি?

ক্যান্ডলে সনিড্রোম এর জন্য কোন কার্যকারী চিকিৎসা নেই। উচ্চমাত্রায় স্টেরয়েডে (১-২ মগিগ্রাঃ প্রতিকর্জে ওজনরে জন্য প্রতদিনি) ব্যবহারে কিছু উপসর্গেরে উপসম হয় যমেন-চামড়ার দানা, জ্বর, গড়া ব্যাথা। কনিতু দানা মাত্রা কমানো শুরু হয় তখনই উপসর্গ সমূহ কপুনরায় ফরিরে আসে। টপ্রিনএফ আলফা বাধা দানকারী ঔষধ এবং ওখ-১ (এনাকনিরা) ব্যবহারে কিছু রোগীর ক্ষেত্রে সাময়িকি উন্নতি গিয়েছে অন্যান্যদরে ক্ষেত্রে বরং বড়েছে। টসলিটোজুমাভ ব্যবহারে কিছু উন্নতি দেখতে পাওয়া যায়। পরীক্ষামূলক ভাবে জ্যাক কাইনজে বাধা দানকারী ঔষধ টফসিটিনিডি ব্যবহারতি হয়ে চলছে।

ঔষধের পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া গুলো ককি?

করটকি স্ট্রেয়েডেরে সম্ভাব্য পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া গুলো হলো ওজন বড়ে যাওয়া, মুখ ফুলে যাওয়া, মনে ভাব উঠানামা করা। অনকে দীর্ঘ সময় ধরে স্ট্রেয়েডে ব্যবহার করলে শারীরিক বৃদ্ধি কমে যায়, হাড় ক্ষয় হয়ে যায়, উচ্চ রক্তচাপ এবং ডায়াবটসি হতে পারে।

করটকি স্ট্রেয়েডেরে সম্ভাব্য পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া গুলো হলো ওজন বড়ে যাওয়া, মুখ ফুলে যাওয়া, মনে ভাব উঠানামা করা। অনকে র্দীঘ সময় ধরে স্ট্রেয়েডে ব্যবহার করলে শারীরিক বৃদ্ধি কমে যায়, হাড় ক্ষয় হয়ে যায়, উচ্চ রক্তচাপ এবং ডায়াবটসি হতে পারে।

কত দিন চকিৎসা করতে হবে?

চকিৎসা চলবে সারাজীবন

অগতানুগতকি বা পরস্পরক চকিৎসাগুলো ককি?

ক্যান্ডল সনিড্রোম এর ক্ষেত্রে এধরনরে কোন চকিৎসার কোন প্রমান পাওয়া যায়নি।

কতদিন পরস্পর চকে-আপ করতে হবে?

এই রোগে আক্রান্ত বাচ্চাদেরকে অসুখটিনিয়ন্ত্রনরে রাখার এবং ঔষধরে মাত্রা ঠকি রাখার জন্য নিয়মতি (বছওে কমপক্ষে ৩ বার) শিশু বারজ্বর বিশেষণরে কাছনে নিয়ে যতে হবে। বছওে অন্তত দুবার রক্ত ও প্রসাব পরীক্ষা করতে হবে।

কতদিন পর্যন্ত এই রোগ থাকবে?

ক্যান্ডল একটা জীবনব্যাপী অসুখ। যাহোক, অসুখরে মাত্রা উঠা নামা করতে পারে।

দীর্ঘময়াদী পরনিতকি?

আয়ু কমে যতে পারে, বিভিন্ন অঙগরে প্রদাহরে ফল হিসেবে মৃত্যুও হতে পারে। যহেতু আক্রান্ত শিশুদরে শিশুদরে কর্মক্ষমতা কমে যায়। জ্বর, ব্যাথা এবং ঘনঘন মারাত্মক প্রদাহরে কারণে জীবনযাপনরে গুণগত মান কমে যায়।

সম্পূর্ণ নিরাময় কিসম্ভব?

না, সম্ভব নয়, কেননা এটা জনিগত রোগ