



<https://printo.it/pediatric-rheumatology/GR/intro>

Φαρμακευτική Αγωγή

Έκδοση από 2016

10. Σαλαζοπυρίνη

10.1 Περιγραφή

Η Σαλαζοπυρίνη είναι το αποτέλεσμα ενός συνδυασμού ενός αντιβακτηριακού και ενός αντιφλεγμονώδους φαρμάκου. Είχε παραχθεί αρκετά χρόνια πριν, όταν πίστευαν ότι η ρευματική αρθρίτιδα είναι μεταδοτική. Παρόλο που η λογική για την χρήση αποδεικνύεται λανθασμένη, η Σαλαζοπυρίνη έχει φανεί ότι είναι αποτελεσματική σε κάποιες μορφές αρθρίτιδας καθώς και σε κάποιες ασθένειες που χαρακτηρίζονται από φλεγμονώδεις παθήσεις του εντέρου.

10.2 Δοσολογία/ Τρόποι χορήγησης

Η Σαλαζοπυρίνη χορηγείται από το στόμα σε 50mg / ανά κιλό /ανά μέρα, με μάξιμουμ τα 2g ανά μέρα

10.3 Παρενέργειες

Παρενέργειες είναι συνηθισμένες και απαιτούν περιοδικές αναλύσεις αίματος. Περιλαμβάνουν γαστροεντερικά προβλήματα (ανορεξία, ναυτία, εμετό και διάρροια) αλλεργία με δερματικά εξανθήματα, ηπατική τοξικότητα (ψηλά επίπεδα τρανσαμινασών), μειωμένος αριθμός λευκών αιμοσφαιρίων, μειωμένη συγκέντρωση ανοσοσφαιρινών στον ορό του αίματος

Αυτό το φάρμακο δεν πρέπει να δοθεί σε ασθενείς με συστηματική Ν.Ι.Α ή Νεανικό ΣΕΛ, γιατί μπορεί να προκαλέσει έξαρση της ασθένειας ή το Σύνδρομο διέργεσης Μακροφάγων.

10.4 Κύριες Ενδείξεις στις παιδορευματολογικές ασθένειες
Νεανική Ιδιοπαθής Αρθρίτιδα (κυρίως ενθεσίτιδα - σχετιζόμενη με την
Νεανική Ιδιοπαθή Αρθρίτιδα)