



<https://printo.it/pediatric-rheumatology/HU/intro>

## **Gyógyszeres Kezelés**

Verzió 2016

### **2. Ciklosporin A**

#### **2.1 Leírás**

A ciklosporin A egy immunszuppresszív gyógyszer, amelyet kezdetben a transzplantált (szervátültetésen átesett) betegeknél alkalmaztak a szervkilökődés megelőzésére, de ma már gyermekkori reumás betegségekre is adják. Ez a szer nagymértékben gátolja a fehérvérsejtek azon csoportját, amely alapvető szerepet játszik az immunválaszban.

#### **2.2 Adagolás, az alkalmazás módjai**

A ciklosporin A belsőleges oldat vagy tablettá formájában adható napi 3-5 mg/kg, 2 részre osztott dózisban.

#### **2.3 Mellékhatások**

A mellékhatások elég gyakoriak, kiváltképp nagy adagok esetén, és korlátozhatják a gyógyszer használatát. Ilyen mellékhatások például: vesekárosodás, magas vérnyomás, májkárosodást, ínymegvastagodás, fokozott szőrnövekedés, hányinger és hányás.

A ciklosporinnal történő kezelés ezért rendszeres klinikai és laboratóriumi kontrollvizsgálatokat igényel a gyógyszer esetleges mellékhatásainak ellenőrzése céljából. Otthon rendszeresen mérni kell a gyermek vérnyomását.

#### **2.4 Javallatok a főbb gyermekkori reumás betegségekre**

---

**kezelésére**

Makrofágaktivációs szindróma.

Gyermekekori dermatomiozitisz.