

[https://printo.it/pediatric-rheumatology/IL\\_IL/intro](https://printo.it/pediatric-rheumatology/IL_IL/intro)

## טיפול תרופתי

גרסת 2016

### 10. סולפסליזין

#### 10.1 תיאור

תרופה זו היא שילוב של אנטיביוטיקה יחד עם חומר נוגד דלקת. התרופה נוצרה לפני שנים רבות כאשר עדיין האמינו שדלקת מפרקים שיגרנית של מבוגרים הינה מחלה זיהומית. למרות שהמחשבה שגרמה לשימוש בהן הוכחה כמוטעית, סולפסליזין הוכחה כיעילה בטיפול בסוגים שונים של דלקות מפרקים, כמו גם בטיפול במחלות מעי דלקתיות כרוניות.

#### 10.2 מינון / דרך מתן התרופה

סולפסליזין ניתנת דרך הפה במינון 50 מ"ג/ק"ג/יום, עד מינון מקסימלי של 2 גרם ביום.

#### 10.3 תופעות לוואי

תופעות הלוואי אינן נדירות ודורשות ביצוע בדיקות תקופתיות. הן כוללות בעיות הקשורות למערכת העיכול (חוסר תאבון, הקאות, בחילות, שלשולים), תגובה אלרגית מלווה בפריחה, עליה באנזימי כבד, ירידה במספר תאי הדם, ירידה בריכוז האימונוגלובולינים (נוגדנים).

אסור לתת תרופה זו לחולים בצורה המערכתית של דלקת מפרקים אידיופטית של הילדות או לחולים בזאבת אדמנתית מערכתית של הילדות, משום שהיא יכולה לגרום להתלקחות חמורה של מחלות אלו או לתסמונת הפעלת מקרופאגים.

#### 10.4 התוויות עיקריות למחלות ראומטיות של הילדות

דלקת מפרקים אידיופטית של הילדות (בעיקר הצורה המופיעה עם אנטיזיטיס, ולא הצורה המערכתית).