

[https://printo.it/pediatric-rheumatology/IL\\_IL/intro](https://printo.it/pediatric-rheumatology/IL_IL/intro)

## טיפול תרופתי

גרסת 2016

### 2. ציקלוספורין A

#### 2.1 תיאור

ציקלוספורין A היא תרופה אימונוסופרסיבית, כלומר מדכאת את מערכת החיסון. במקור היא שימשה למניעת דחיית איברים אצל מטופלים שעברו השתלת איברים, אך כיום היא משמשת גם לטיפול במחלות ילדים ראומטיות. היא מעכבת באופן פוטנטי קבוצת תאי דם לבנים בעלי תפקיד חשוב בתגובה החיסונית.

#### 2.2 מינון / דרך מתן התרופה

ניתן לתת את התרופה באמצעות נוזל או גלולות, במינון של 3-5 מ"ג לק"ג ליום ב-2 מנות.

#### 2.3 תופעות לוואי

תופעות הלוואי של תרופה זו הן די נפוצות, במיוחד במינונים גבוהים, ועשויים להגביל את השימוש בתרופה. הם כוללים נזק לכליה, לחצי דם גבוהים, נזק לכבד, הגדלה של החניכיים, צמיחת שיער על גבי הגוף, בחילות והקאות. טיפול בציקלוספורין מצריך ביקורי מעקב במרפאה ובדיקות מעבדתיות תקופתיות כדי להעריך את תופעות הלוואי של התרופה. ילדים המטופלים בתרופה חייבים לבדוק לחץ דם באופן סדיר בבית.

#### 2.4 התוויות עיקריות למחלות ראומטיות של הילדות

תסמונת הפעלת מקרופאגים.

דרמטומיוזיטיס של הילדות.