

[https://printo.it/pediatric-rheumatology/IL\\_IL/intro](https://printo.it/pediatric-rheumatology/IL_IL/intro)

## טיפול תרופתי

גרסת 2016

### 9. הידרוקסיכלורוקווין

#### 9.1 תיאור

הידרוקסיכלורוקווין פותחה במקור לטיפול במלריה. הוכח שהיא מעכבת תהליכים מסוימים הקשורים בדלקת.

#### 9.2 מינון / דרך מתן התרופה

התרופה ניתנת פעם ביום בבליעה, במינון עד 7 מ"ג/ק"ג/יום, עם האוכל או בליווי כוס חלב.

#### 9.3 תופעות לוואי

הידרוקסיכלורוקווין היא בדרך כלל תרופה בעלת סבילות טובה. עשויות להופיע תופעות לוואי במערכת העיכול, בעיקר בחילות, אבל הן בדרך כלל לא קשות. הבעיה העיקרית היא רעילות לעיניים. התרופה מצטברת בחלק של העין שנקרא רשתית, ונשאר שם במשך זמן רב לאחר הפסקת התרופה. תופעות אלו בעין הינן נדירות אך עשויות לגרום לעיוורון, אפילו לאחר הפסקת התרופה. עם זאת, חשוב לזכור שבמינונים הנמוכים בהם משתמשים בתרופה כיום התופעות העיניות נדירות ביותר. גילוי מוקדם של סיבוך זה מונע את אובדן הראיה, אם התרופה מופסקת בזמן. יש לבצע בדיקות עיניים תקופתיות, למרות שקיים ספק לגבי נחיצות ותדירות הביקורות הנדרשות, כאשר התרופה ניתנת במינון נמוך כפי שמקובל בטיפול במחלות ראומטיות.

#### 9.4 התוויות עיקריות למחלות ראומטיות של הילדות

דרמטומיוזיטיס של הילדות  
זאבת אדמנתית מערכתית של הילדות

