



https://printo.it/pediatric-rheumatology/IN_HI/intro

सामायिक बुखार के साथ छाले, गले में सूजन (ग्रसनीषोथ ग्रंथपिरदाह) एवं गले की ग्लेण्ड में सूजन (लसिका ग्रंथी कोष) (पी.एफ.ए.पी.ए.)

के संस्करण 2016

1. पी.एफ.ए.पी.ए. क्या है?

1.1 यह क्या है?

पी.एफ.ए.पी.ए. का मतलब सामायिक बुखार के साथ छाले गले तथा लम्फ नोड्स की सूजन है। यह चकित्सा शब्द है जो बुखार के बारम्बार होने वाले हमलों के कारण दिया है। बुखार के साथ गले व लम्फ नोड्स में सूजन, गले में खराब और मुंह में छाले होते हैं। आम तौर पर पी.एफ.ए.पी.ए. शुरूआत में ही पांच साल से कम उम्र के बच्चों को प्रभावित करता है। यह एक दूरिघकालिक समस्या है परन्तु समय के साथ सम्पूर्ण तरीके से ठिक होने की सम्भावना होती है। सन् 1987 में इस बीमारी को पहली बार जाना गया और तब उसे मार्षल सड्रोम कहा जाता था।

1.2 क्या यह आम बीमारी है?

पी.एफ.ए.पी.ए. की आवृत्ति ज्ञात नहीं है लेकिन आम तौर पर यह बीमारी सराहना की तुलना में अधिक आम है।

1.3 इस बीमारी के कारण क्या है?

बीमारी का कारण अज्ञात है। बुखार के दौरान, प्रतिरक्षा प्रणाली सक्रिय होती है। इस सक्रियण से बुखार के साथ गले व मुख की सूजन हो जाती है। यह प्रदाह स्वः समिति है जिसके दो प्रकरण के बीच प्रदाह के रूप में कोई संकेत नहीं मिलते हैं। हमलों के दौरान कोई संक्रामक घटक मौजूद नहीं है।

1.4 क्या यह वरिसत में मली है?

पारिवारिक मामलों में इसे वर्णित किया गया है लेकिन इसके आज तक कोई अनुवांशिक कारण

नहीं मलते हैं।

1.5 क्या यह संक्रामक है?

यह एक संक्रामक बीमारी नहीं है और ना ही फैलती है, लेकिन संक्रमण इस बीमारी को बढ़ावा दे सकते हैं।

1.6 इसके मुख्य लक्षण क्या हैं?

इसके मुख्य लक्षण समय - समय से आने वाले बुखार के साथ, गले में खराब, मुँह में छालों और बड़े हुए गले के लम्फ नोड्स (प्रतिक्रिया प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा) होते हैं। बुखार के प्रकरण अचानक शुरू होते हैं जो तीन से छः दिनों तक रहते हैं। बुखार के दौरान बच्चा बहुत बीमार लगता है और उपर्युक्त तीनों लक्षणों में से कम से कम एक से ग्रसति होता है। बुखार के प्रकरण हर 3-6 हफ्तों में बार-बार आते हैं, कभी-कभी बहुत ही नियमित अंतराल पर आते हैं। दो प्रकरण के अंतराल में बच्चा बिल्कुल सामान्य रहता है। बच्चों के विकास पर कोई बुरा परिणाम नहीं दिखता है, हमलो के अंतराल में बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ दिखाई देता है।

1.7 क्या यह रोग हर बच्चे में समान होता है?

ऊपर वर्णित मुख्य विशेषताएं सभी बच्चों में पाई जाती हैं। कुछ बच्चों में रोग का मामूली स्वरूप हो सकता है, और कुछ में अस्वस्थता, जोड़ों में दर्द, पेट दर्द, सरि दर्द, उल्टी या दस्त के रूप में अतिरिक्त लक्षण हो सकते हैं।