

درمان دارویی

نسخه 2016

10. سولفاسالازین

1.10 تعریف و شناخت

سولفاسالازین از ترکیب یک ضد باکتری و یک داروی ضد التهابی تهیه می شود. سال ها پیش تصور می شد که آرتريت روماتوئید بزرگسالان یک بیماری عفونی است. علی رغم این حقیقت که بعدها معلوم شد که استفاده برای هدف از بین بردن عفونت اشتباه بوده، اما نشان داده شد که سولفاسالازین در چند گروه از انواع آرتريت و گروهی از بیماری ها که با التهاب روده مزمن مشخص میشود، موثر است.

2.10 میزان دارو/ روش-های مصرف دارو

سولفاسالازین به صورت خوراکی 50 میلی گرم در هر کیلوگرم در روز تجویز شده است، تا حداکثر 2 گرم در روز

3.10 عوارض جانبی

عوارض جانبی غیر معمول نیست و نیاز به آزمایش خون دوره ای دارد. آنها عبارتند از مشکلات دستگاه گوارش (بی اشتها، تهوع، استفراغ و اسهال)، آلرژی با خارش پوست، سمیت کبدی (ترانس آمیناز بالا)، کاهش تعداد سلول های خون در گردش، کاهش غلظت ایمونوگلوبولین سرم. این دارو به JA سیستمیک و یا بیماران JSLE هرگز نباید داده شود زیرا می تواند شعله ور شدن شدید بیماری را باعث شود و یا سندرم فعال سازی ماکروفاژ را القا کند.

4.10 کاربرد های اصلی تجویز دارو در بیماری های روماتیسمی کودکان

آرتريت ایدیوپاتیک جوانان {مخصوصا آرتريتی که با انتزیت(التهاب محل اتصال بورس یا تاندون) همراه است}