



<https://printo.it/pediatric-rheumatology/KR/intro>

?

, ' , 16 . ' , .

?

, , 가

가 ?

10 80 90 .

가 ?

() ,

가

, , 가 ,

, 가 , 가

' 가 ' , .

가 ?

가 () 가 ,

() 가

가 가

?

16

,6

(

),

6

가 , ,

?

가

(가) .

() ()

가

가

가

?

가 가

6

() , ()

(가)

10%

: 6 5

가 가 가

1) (5%) , ()

, 10

가

2)
1520%

가 5 : 6 ((5)) 가 5
 6 가 가 가
 가 가 가
 가 3 가
 50% 가 가 ()
 : 가 가 가
 (enthesitis) : 가
 (enthesis) 가
 (HLA-B27), 가 7
 8 ()
 ? (가)
 가

가 ?

70%

50% 5%

가 가 ?

가

(Rheumatoid factor: RF)

(Anticuclear antibody: ANA)

가

3

HLA-B27

80%

(ESR) C

(58%).
(CRP)

가

가

가

?

가

1)

()

(naproxen)

(ibuprofen)

가

가

가

가

가

가

가

2) 가 (Triamcinolone hexacetonide)

3) 2 가 2 (methotrexate) 1

(transaminase, 가) 가가 가 가

(Salazopyrine) 가

(leflunomide) (cyclosporine) 가 (steroid-resistant

macrophage activation syndrome)

(anti-TNF drug)

가 가 가 가 가 2

4) , 2 가 ()

5) ,

6) 가 ,

가 ?

가

가

(

)

가

가

,

.

,

가

.

(folinic folic acid)

가

가

(hypertransaminasemia,),

(

가

)

,

가

가

(anti-TNF agent)

가

가

가

?

.

.

(, Slit lamp examination)

(

가

)

3

?

,

,

(, ,)

(

)

가 ?

가,

가

10

가

가

가

가

가

가 , 가 가

가 .
1/4

가
가
가

가 ?
()

가 ?
가 (, (MMR, Sabin) , BCG)
DTP, Salk , B ,) (:

가 ? 가
가 가 , 가

가 가 ?

?

가

