



<https://printo.it/pediatric-rheumatology/LT/intro>

Medikamentinis Gydyimas

Versija 2016

9. HIDROKSICHLOROKVINAS

9.1. Apibūdinimas

Hidroksichlorokvinas pirmiausia buvo naudojamas maliarijai gydyti. Nustatyta, kad jis daro įtaką tam tikriems procesams, susijusiems su uždegimu.

9.2. Dozavimas / skyrimo būdai

Skiriamas viena dozė tabletėmis iki 7 mg/kg per dieną kartu su maistu ar stikline pieno.

9.3. Šalutinis poveikis

Paprastai hidroksichlorokvinas yra gerai toleruojamas. Gali sutrikti viršiamojo trakto veikla (paprastai ligonį pykina), bet negalavimas nėra sunkus. Didžiausią susirūpinimą kelia toksiškas poveikis akims.

Hidroksichlorokvinas kaupiasi tam tikroje akies dalyje – tinklainėje ir ten išlieka ilgą laiką, net ir nutraukus vaisto vartojimą.

Šie pakitimai reti, bet gali sukelti aklumą net ir tada, kai vaistas jau nebevartojamas. Vis dėlto ši akių problema iškyla labai retai, jei vaistas geriamas mažomis dozėmis.

Apsaugoti nuo regos netekimo galima kuo anksčiau nustačius komplikacijas, kai vaisto vartojimas nutrauktas. Reikėtų periodiškai tikrintis akis, nors ir diskutuojama dėl patikros poreikio ir dažnio tais atvejais, kai hidroksichlorokvinas skiriamas mažomis dozėmis (gydant reumatinės ligas).

9.4. Pagrindinės vaikų reumatinių ligų indikacijos

Jaunatvinis dermatomiozitas

Jaunatvinė sisteminė raudonoji vilkligė