



<https://printo.it/pediatric-rheumatology/NO/intro>

## **Tilstander som gir Smerter i Armer eller Bein**

Versjon av 2016

### **9. Femoral epifysiolyse**

#### **9.1 Hva er det?**

Tilstanden er forårsaket av en løsning av vekstsonen på lårbenets øvre ende (ved hoften). Vekstsonen er et område av knokkelen som, så lenge man er i vekst, består av brusk, og som er den svakeste delen av knokkelen. Når man er ferdig utvokst vil vekstsonen være omgjort til ben, som resten av knokkelen. Årsaken til tilstanden er ukjent.

#### **9.2 Hvor vanlig er det?**

Sykdommen er uvanlig, kun 3-10 av 100 000 barn pr. år får den. Den er vanligst hos ungdom og hos gutter. Overvekt ser ut til å øke risikoen for å få sykdommen.

#### **9.2 Hva er de vanligste symptomene?**

De vanligste tegnene på sykdommen er halting, smerter og redusert bevegelse i hoften. Smertene øker ved fysisk aktivitet og kjennes vanligvis i øvre 2/3 eller nedre 1/3 av låret. Hos 15 % av barna rammes begge hofter.

#### **9.4 Hvordan stilles diagnosen?**

Det typiske er at man ved undersøkelse finner redusert bevegelse i hoften. Diagnosen bekreftes ved røntgen, fortrinnsvis tatt med hoftene i utadrottert stilling, "froskeben-stilling".

---

### **9.5 Hva er behandlingen?**

Tilstanden betraktes som et hoftebrudd og krever øyeblikkelig operasjon, der det settes inn pinner som stabiliserer den løse delen av knokkelen.

### **9.6 Hva er fremtidsutsiktene (prognosen)?**

Dette varierer i hvert enkelt tilfelle og vil være avhengig av hvor lang tid som er gått mellom skade og behandling samt av hvor stor glidning det er snakk om.