



<https://printo.it/pediatric-rheumatology/PL/intro>

## **Leczenie Farmakologiczne**

Wersja 2016

### **2. Cyklosporyna A**

#### **2.1 Opis**

Cyklosporyna A jest lekiem immunosupresyjnym, początkowo stosowanym do zapobiegania odrzucaniu narządów u pacjentów po przeszczepie. Obecnie stosuje się ją również w leczeniu reumatycznych chorób wieku rozwojowego. Jest ona silnie działającym inhibitorem grupy białych krwinek, które pełnią kluczową rolę w odpowiedzi immunologicznej organizmu.

#### **2.2 Dawkowanie/sposób podania**

Można ją podawać w formie płynu albo tabletek, a dawkowanie wynosi 3–5 mg na kilogram masy ciała dziennie w 2 dawkach.

#### **2.3 Działania niepożądane**

Działania niepożądane są dość częste, szczególnie przy dużych dawkach i mogą ograniczać stosowanie leku. Obejmują one uszkodzenia nerek, nadciśnienie, uszkodzenia wątroby, przerost dziąseł, nadmierne owłosienie, nudności i wymioty.

W związku z tym leczenie cyklosporyną wymaga regularnych kontroli klinicznych i laboratoryjnych, aby ocenić działania niepożądane leku. W domu dzieci muszą regularnie kontrolować ciśnienie krwi.

#### **2.4 Główne wskazania w chorobach reumatycznych wieku rozwojowego**

---

Zespół aktywacji makrofagów.

Młodzieńcze zapalenie skórno-mięśniowe.