



<https://printo.it/pediatric-rheumatology/PL/intro>

## **Leczenie Farmakologiczne**

Wersja 2016

### **3. Dożylne immunoglobuliny**

#### **3.1 Opis**

Immunoglobulina to synonim przeciwciała. Dożylnie podawane immunoglobuliny (IVIg) są przygotowane z puli osocza pobranego od zdrowych krwiodawców. Osocze to płynny składnik ludzkiej krwi. IVIg są stosowane w leczeniu dzieci, które nie mają przeciwciał w związku z niedoborem odporności. Jednak mechanizmy ich działania są jeszcze niejasne i mogą być różne w zależności od sytuacji. Wykazano też, że IVIg są przydatne w leczeniu niektórych chorób autoimmunologicznych i reumatycznych.

#### **3.2 Dawkowanie/sposób podania**

Podaje się je dożylnie, według różnych schematów, w zależności od choroby.

#### **3.3 Działania niepożądane**

Działania niepożądane są rzadkie i obejmują reakcje anafilaktyczne (alergiczne), ból mięśni, gorączkę i ból głowy podczas podawania leku (wlewu), ból głowy i wymioty z powodu nieinfekcyjnego podrażnienia opon mózgowych (które lekarze nazywają aseptycznym i które oznacza istnienie stanu zapalnego błony otaczającej mózg). Występują w ciągu około 24 godzin po wlewie.

Te działania niepożądane ustępują samoistnie. Niektórzy pacjenci, szczególnie cierpiący na chorobę Kawasakiego i hipoalbuminemię, podczas przyjmowania IVIg mogą mieć mocno obniżone ciśnienie krwi,

---

w związku z tym muszą pozostawać pod ścisłą kontrolą doświadczonego zespołu lekarzy.

IVIG są wolne od wirusa HIV, wirusa zapalenia wątroby i większości innych znanych wirusów.

### **3.4 Główne wskazania w chorobach reumatycznych wieku rozwojowego**

Choroba Kawasaki.

Młodzieńcze zapalenie skórno-mięśniowe.