



<https://printo.it/pediatric-rheumatology/RO/intro>

## **Terapia Medicamentoasă**

Versiunea 2016

### **2. Ciclosporina A**

#### **2.1 Descriere**

Ciclosporina A este un medicament imunosupresor, utilizat inițial pentru a preveni respingerea organului la pacienții care au suferit operații de transplant, dar acum este utilizată și pentru bolile reumatice pediatrice. Este un inhibitor puternic al unui grup de celule albe din sânge care au un rol fundamental în răspunsul imunitar.

#### **2.2 Dozare/moduri de administrare**

Se poate administra sub formă de sirop sau tablete la o doză de 3-5 mg/kg/e zi, în 2 subdoze.

#### **2.3 Efecte secundare**

Efectele secundare sunt destul de frecvente, în special la doze mari și pot limita utilizarea medicamentului. Acestea includ leziuni renale, hipertensiune arterială, leziuni hepatice, dezvoltarea în exces a gingiilor, creșterea pilozității, greață și vărsături. Prin urmare, tratamentul cu ciclosporină impune controale frecvente (clinice și de laborator), necesare pentru evaluarea efectelor secundare. Copiilor trebuie să li se verifice tensiunea arterială în mod regulat la domiciliu.

#### **2.4 Principalele indicații în bolile reumatice pediatrice**

Sindromul de activare macrofagică.

---

Dermatomiozita juvenilă.