



<https://printo.it/pediatric-rheumatology/RO/intro>

Terapia Medicamentoasă

Versiunea 2016

9. Hidroxiclorochina

9.1 Descriere

Hidroxiclorochina a fost inițial utilizată în tratamentul malariei. S-a dovedit că interferează cu anumite procese implicate în inflamație.

9.2 Dozare/moduri de administrare

Se administrează pe cale orală, până la 7 mg/kg/zi, în timpul mesei sau cu un pahar de lapte.

9.3 Efecte secundare

Hidroxiclorochina este de obicei bine tolerată. Intoleranța gastrointestinală, mai ales greața, poate să apară, dar nu este gravă. Principala toxicitate este cea oculară. Hidroxiclorochina se acumulează în retină și persistă perioade lungi de timp după oprirea terapiei. Aceste leziuni sunt rare, dar pot cauza pierderea vederii chiar și după ce medicația a fost oprită. Totuși, la dozele mici utilizate în prezent, aceste probleme oculare sunt extrem de rare.

Depistarea precoce a acestei complicații și întreruperea medicației previn pierderea vederii. Prin urmare, examinările periodice ale ochilor sunt necesare, deși există o controversă în privința necesității și frecvenței acestor controale, dacă se folosesc doze mici de hidroxiclorochină, ca în cazul bolilor reumatice.

9.4 Principalele indicații în bolile reumatice pediatrice

Dermatomiozita juvenilă
Lupusul eritematos sistemic juvenil.