



<https://printo.it/pediatric-rheumatology/RS/intro>

## **Bolni sindromi**

Verzija 2016

### **4. Eritromelalgija**

#### **4.1 Kakva je to bolest?**

Ova bolest je takođe poznata i kao "eritermalgija". Naziv potiče od 3 grčke reči: eritros (crven), melos (ekstremitet) i algos (bol). Vrlo je retka, ali se može javiti u porodicama. Većina obolele dece na početku bolesti je uzrasta oko 10 godina. Češće se javlja kod devojčica.

Simptomi bolesti su osećaj peckanja, toplina, crvenilo i otok stopala ili ređe šaka. Izlaganje toploti pogoršava simptome, a hlađenje ekstremiteta ih smiruje. Zbog toga neka deca odbijaju da izvade stopalo iz ledene vode. Tok bolesti je takav da nema tendenciju da se ublažava i poboljšava. Bolest može da se kontroliše izbegavanjem izlaganja toploti i intenzivnog vežbanja.

Različiti lekovi se primenjuju sa ciljem da se ublaži bol, uključujući antizapaljenske lekove, lekove protiv bolova i lekove za poboljšanje cirkulacije ("vazodilatatori"). Lekar će odrediti koji je lek najpogodniji za svako dete.