



<https://printo.it/pediatric-rheumatology/RU/intro>

## ЛЕКАРСТВЕННАЯ ТЕРАПИЯ

Версия 2016

### 10. Сульфасалазин

#### 10.1 Описание

Сульфасалазин был получен путем комбинации антибактериального препарата и противовоспалительного препарата. Он был задуман много лет назад, когда считалось, что ревматоидный артрит у взрослых является инфекционным заболеванием. Несмотря на то, что основание для его использования впоследствии оказалось ошибочным, было показано, что сульфасалазин эффективен при некоторых формах артрита, а также при заболеваниях, характеризующихся хроническим воспалением кишечника.

#### 10.2 Дозировка/способы введения

Сульфасалазин вводят перорально в дозе 50 мг на кг в день, максимум до 2 г в день.

#### 10.3 Побочные эффекты

Побочные эффекты нередки и требуют периодического контроля анализов крови. Они включают желудочно-кишечные проблемы (анорексия, тошнота, рвота и диарея), аллергию, сопровождающуюся кожной сыпью, токсическое влияние на печень (повышение активности трансаминаз), снижение числа циркулирующих клеток крови и снижение концентрации иммуноглобулинов в сыворотке крови.

Этот препарат никогда нельзя давать больным с системным ЮИА

---

или ЮСКВ, потому что это может вызвать серьезное обострение заболевания или развитие синдрома активации макрофагов.

#### **10.4 Основные показания для лечения ревматических заболеваний у детей**

Ювенильный идиопатический артрит (в основном ЮИА, связанный с энтезитом).