



<https://printo.it/pediatric-rheumatology/RU/intro>

## **ЛЕКАРСТВЕННАЯ ТЕРАПИЯ**

Версия 2016

### **2. Циклоспорин А**

#### **2.1 Описание**

Циклоспорин является иммуносупрессором, который изначально использовался для предотвращения отторжения органов у пациентов, перенесших операции по трансплантации, но теперь он используется также и для лечения ревматических заболеваний у детей. Это мощный ингибитор группы белых кровяных клеток, которые играют фундаментальную роль в иммунном ответе.

#### **2.2 Дозировка/способы введения**

Препарат можно давать в жидком виде или в форме таблеток в дозе 3-5 мг на кг в день в 2 приема.

#### **2.3 Побочные эффекты**

Побочные эффекты довольно часты, особенно при больших дозах, и могут ограничивать применение препарата. Они включают нарушение функции почек, повышение артериального давления, нарушение функции печени, разрастание десен, рост волос по всему телу, тошноту и рвоту.

В связи с этим лечение циклоспорином требует регулярных клинических и лабораторных обследований для оценки побочных эффектов препарата. Дети должны регулярно проверять артериальное давление у себя дома.

---

## **2.4 Основные показания для лечения ревматических заболеваний у детей**

Синдром активации макрофагов.

Ювенильный дерматомиозит.