



<https://printo.it/pediatric-rheumatology/TR/intro>

## **Kronik Bakteriyel Olmayan Osteomyelit /Osteit (veya CRMO)**

2016'un türevi

### **1. CRMO NEDİR**

#### **1.1 Nedir?**

Kronik, Tekrarlayan, Multifokal Osteomyelit (CRMO) çoğu kez Kronik, Bakteriyel Olmayan Osteomyelit (CNO) en ciddi formudur. Çocuk ve ergenlerde enflamatuvar lezyonlar ağırlıklı olarak uzun kemiklerin metafizlerini etkiler. Ancak bu lezyonlar iskeletin herhangi bir yerinde de görülebilirler. Dahası cilt, gözler, sindirim kanalı ve eklemler gibi başka organlar da etkilenebilir.

#### **1.2 Ne kadar yaygındır?**

Hastalığın sıklığı ile ilgili ayrıntılı çalışma yapılmamıştır. Avrupa ulusal kayıtlarından gelen verilere göre, 10.000'de 1-5 birey etkilenmiş olabilir. Cinsiyet hakimiyeti yoktur.

#### **1.3 Hastalığın sebepleri nelerdir?**

Nedenleri bilinmemektedir. Bu hastalıkla doğuştan gelen bağışıklık sistemindeki bir bozukluk arasında bir bağlantı olduğu hipotezi mevcuttur. Hipofosfatazya, Camuratti - Engelman Sendromu veya benign hiperosteoz - pakidermoperiyostoz ve histiyositoz gibi bazı nadir kemik metabolizması hastalıkları CRMO'yu taklit edebilir.

#### **1.4 Kalıtsal mıdır?**

---

Kalıtımsal olduđu hipotezi ispatlanmamıřtır. Aslında ailesel vakalar ok azdır.

### **1.5 ocuđumda bu hastalık neden oldu? nlenebilir mi?**

Nedenleri řimdilik bilinmemektedir. Koruyucu nlem bilinmemektedir.

### **1.6 Bulařıcı mıdır veya kiřiden kiřiye geer mi?**

Hayır deđildir. Son incelemelerde etken enfeksiyz bir ajan (mesela bakteri) bulunmamıřtır.

### **1.7 Bařlıca belirtileri nelerdir?**

Hastalar genellikle eklem ve kemik ađrısından yakındıđı iin juvenil idiopatik artrit ve bakteriyel osteomyelitten ayırıcı tanısı yapılmalıdır. Klinik muayene ile esasen hastaların nemli bir kısmında artrit saptanabilir. Blgesel kemik řiřliđi ve hassasiyeti sıktır, topallama veya iřlev kaybı olabilir. Hastalıđın kronik veya tekrarlayıcı bir seyri olabilir.

### **1.8 Hastalık her ocukta aynı mıdır?**

Her ocukta aynı deđildir. Dahası, kemik tutulumunun tipi, belirtilerin sresi ve ciddiyeti hastadan hastaya farklılık gsterir. Hatta hastalıđın tekrarlayan seyri gz nnde bulundurulursa, aynı ocukta bile farklar grlebilir.

### **1.9 ocuklardaki hastalık eriřkinlerdeki hastalıktan farklı mıdır?**

Genel olarak, ocuklarda CRMO yetiřkinlerdekiyle benzerdir. Ancak, hastalıđın cilt tutulumu (sedef, pstlz akne) gibi bazı zellikleri eriřkinlerde daha sıktır. Yetiřkinlerde bu hastalıđa; sinovit, akne, pstlz, hiperostoz ve osteitin kısaltması olarak SAPHO sendromu denilmektedir. CRMO ise SAPHO sendromunun ocuk ve ergenlerdeki hali olarak dřnlr.