https://printo.it/pediatric-rheumatology/TW/intro

藥物治療

第? 版本

11.秋水仙素

11.1概述

秋水仙素已經被發現幾個世紀，它來自于秋水仙（是百合科的有花植物）乾燥的種子，它能夠抑制白細胞的數量和功能，從而阻斷發炎反應。

11.2劑量/用法

它通常是口服給藥，1-1.5mg/天。在某些情況下，可能需應用更大的劑量(2-2.5mg/天)。在極少數治療無反應的病人中，給予靜脈注射。

11.3副作用

大部分副作用與胃腸系統有關。腹瀉、噁心、嘔吐和偶爾有腹部絞痛，可以進食無乳糖的食物來緩解。暫時減少劑量可以使副作用緩解。反應消失之後，緩慢增加劑量至原來的水準。 還可能有血細胞的減少，因此，要定期檢測血象。

肌無力（肌炎）可以在伴有腎臟或肝臟疾病的病人中看到，停藥後可以恢復。

另一種罕見的副作用是末梢神經的改變（周圍神經病），這種罕見的情況恢復是緩慢的。偶爾可以見到皮疹和脫髮。

大量用藥後可能發生嚴重的毒性反應。秋水仙素中毒需要進行治療，經過治療可以逐漸恢復，但有時候卻是致命的。所以父母要非常警惕，藥物要放在小孩接觸不到的地方。秋水仙素在治療家族性地中海熱時，可以在整個懷孕期應用，但需要向婦科醫生諮詢。

11.4兒科風濕性疾病主要適應症

家族性地中海熱。

一些其他自身發炎性疾病包括復發性心包炎