https://printo.it/pediatric-rheumatology/TW/intro

藥物治療

第? 版本

3. 靜脈輸注免疫球蛋白（IVIG）

3.1概述

免疫球蛋白與抗體是同義詞。靜脈用免疫球蛋白（IVIG）是來自大量健康供血者的血漿，血漿是人血的液體成分。IVIG是一種治療方法，用於治療由於免疫系統缺陷造成的抗體缺乏。但其機理仍然不清楚，而且不同的情況機理可能是不同的。IVIG在一些自身免疫性疾病和風濕性疾病的治療中也有一定作用。

3.2劑量/用法

給藥途徑為靜脈輸注，依疾病不同而劑量不同。

3.3副作用

其副作用是罕見的，包括過敏反應、肌肉疼痛、輸液過程中發熱和頭痛，由於非感染性的腦膜反應（無菌性腦膜炎）導致的頭痛和嘔吐，大約持續24小時。

這些副作用可自行緩解。有些患者，特別是川崎病和低白蛋白血症的患者，可能會在輸注IVIG時出現嚴重低血壓；這些患者需要由經驗豐富的醫護團隊密切監測。

IVIGs是不含HIV、肝炎和大部分其他已知的病毒的。

3.4兒科風濕性疾病主要適應症

川崎病

幼年皮肌炎