
NSAIDs
NSAIDs
NSAIDs

3-4

NSAIDs
NSAIDs

Methotrexate

methotrexate
15mg/m2
1
methotrexate
(GOT)
methotrexate
methotrexate

methotrexate
methotrexate

JIA
A
JIA
JIA

" "

3.3 患者教育/啓蒙

患者教育/啓蒙は、患者が適切な治療を受け、病状を管理し、生活の質を向上させるために重要です。患者は、医師の指示に従い、薬を正しく服用し、定期的な検査を受ける必要があります。また、病状の悪化や副作用の発生を早期に発見し、医師に報告することが重要です。

3.4 治療

治療は、患者の病状の重症度や合併症の有無に基づいて決定されます。軽症の患者には、非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs)が第一選択薬として処方されます。重症の患者には、メソトレキサート(methotrexate)やTNF阻害剤が処方されます。メソトレキサートは、週1回服用する薬であり、副作用として骨髄抑制や肝臓障害がみられることがあります。TNF阻害剤は、免疫系を抑制する作用があり、感染症のリスクを高める可能性があります。

3.5 患者教育/啓蒙

患者教育/啓蒙は、患者が適切な治療を受け、病状を管理し、生活の質を向上させるために重要です。患者は、医師の指示に従い、薬を正しく服用し、定期的な検査を受ける必要があります。また、病状の悪化や副作用の発生を早期に発見し、医師に報告することが重要です。

15歳未満の小児患者は、メソトレキサート(methotrexate)を服用する際に注意が必要です。メソトレキサートは、小児患者に骨髄抑制や肝臓障害を引き起こす可能性があります。また、メソトレキサートは、妊婦に服用すると胎児に重大な副作用を引き起こす可能性があります。

患者教育/啓蒙は、患者が適切な治療を受け、病状を管理し、生活の質を向上させるために重要です。患者は、医師の指示に従い、薬を正しく服用し、定期的な検査を受ける必要があります。また、病状の悪化や副作用の発生を早期に発見し、医師に報告することが重要です。

PRINTO(www.printo.it)やPRCSG(www.prcsg.org)は、患者教育/啓蒙のための重要なリソースです。PRINTOは、小児患者のための治療ガイドラインを提供しています。PRCSGは、小児患者のための治療ガイドラインを提供しています。

患者教育/啓蒙は、患者が適切な治療を受け、病状を管理し、生活の質を向上させるために重要です。患者は、医師の指示に従い、薬を正しく服用し、定期的な検査を受ける必要があります。また、病状の悪化や副作用の発生を早期に発見し、医師に報告することが重要です。

JIA患者は、メソトレキサート(methotrexate)を服用する際に注意が必要です。メソトレキサートは、小児患者に骨髄抑制や肝臓障害を引き起こす可能性があります。また、メソトレキサートは、妊婦に服用すると胎児に重大な副作用を引き起こす可能性があります。

患者教育/啓蒙は、患者が適切な治療を受け、病状を管理し、生活の質を向上させるために重要です。患者は、医師の指示に従い、薬を正しく服用し、定期的な検査を受ける必要があります。また、病状の悪化や副作用の発生を早期に発見し、医師に報告することが重要です。

JIA患者は、メソトレキサート(methotrexate)を服用する際に注意が必要です。メソトレキサートは、小児患者に骨髄抑制や肝臓障害を引き起こす可能性があります。また、メソトレキサートは、妊婦に服用すると胎児に重大な副作用を引き起こす可能性があります。

3.6 患者教育/啓蒙

NSAIDs NSAIDs
MTX MTX
2000 PRINTO PRES
JIA JIA

3.7

JIA 6-12 JIA

3.8 1

ANA 3

3.9

JIA 40% 8-10 JIA
IL-6 IL-1
RF JIA RF

