



---

NSAIDs  
NSAIDs  
NSAIDs

3-4

NSAIDs  
NSAIDs

**Methotrexate**

methotrexate  
15mg/m2  
1  
methotrexate  
(GOT)  
methotrexate  
methotrexate

methotrexate  
methotrexate

JIA  
A  
JIA  
JIA

" "



---

### 3.3 患者教育/啓蒙

患者教育/啓蒙は、患者が適切な治療を受け、病状を管理し、生活の質を向上させるために重要です。患者は、医師の指示に従い、薬を正しく服用し、定期的な検査を受ける必要があります。また、病状の悪化や副作用の発生を早期に発見するために、症状の変化を注意深く観察し、医師に報告することが重要です。

### 3.4 治療

治療は、患者の病状の重症度や合併症の有無に基づいて決定されます。軽症の患者には、非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs)が第一選択薬として処方されます。重症化した場合、メソトレキサート(メソト)やTNF阻害薬(メソト)が処方されます。メソトは、メソトレキサート(メソト)とTNF阻害薬(メソト)の併用療法が効果的であるとされています。

### 3.5 診断

診断は、15歳未満の患者にJIAを診断するための基準に基づいて行われます。診断には、臨床症状、血液検査、画像検査などが用いられます。PRINTO(www.printo.it)やPRCSG(www.prcsg.org)は、JIAの診断基準を提供しています。また、FDA(EMA)は、JIAの治療薬の承認プロセスを管理しています。メソトレキサート(メソト)は、JIAの治療に広く使用されています。

### 3.6 結論

---

NSAIDs NSAIDs  
MTX MTX  
2000 PRINTO PRES  
JIA JIA

### 3.7

JIA 6-12 JIA

### 3.8 1

ANA 3

### 3.9

JIA 40% 8-10 JIA  
IL-6 IL-1  
RF JIA RF

