
NSAIDs
NSAIDs
NSAIDs

3-4

NSAIDs
NSAIDs

Methotrexate

methotrexate
15mg/m2
1
methotrexate
(GOT)
methotrexate
methotrexate

methotrexate
methotrexate

JIA
A
JIA
JIA

"

3.3 患者教育/啓蒙

患者教育/啓蒙は、患者が適切な治療を受け、病状を管理し、生活の質を向上させるために重要です。患者は、医師の指示に従い、薬を正しく服用し、定期的な検診を受ける必要があります。また、病状の悪化や副作用の発生を早期に発見し、医師に報告することが重要です。

3.4 治療

治療は、患者の病状の重症度や合併症の有無に基づいて決定されます。軽症の患者には、非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs)が第一選択薬として処方されます。重症の患者には、メソトレキサート(methotrexate)やTNF阻害薬が処方されます。メソトレキサートは、週1回服用する薬であり、TNF阻害薬は、定期的な注射による治療です。

3.5 患者教育/啓蒙

患者教育/啓蒙は、患者が適切な治療を受け、病状を管理し、生活の質を向上させるために重要です。患者は、医師の指示に従い、薬を正しく服用し、定期的な検診を受ける必要があります。また、病状の悪化や副作用の発生を早期に発見し、医師に報告することが重要です。

15歳未満の小児は、JIAの治療に慎重に扱われます。小児は、成長障害や骨髄抑制などの副作用に注意する必要があります。また、定期的な検診を受けることが重要です。

PRINTO(www.printo.it)は、50以上の国で活動している国際的な患者教育/啓蒙の組織です。PRCSG(www.prcsg.org)は、JIAの患者教育/啓蒙を目的とした組織です。PRINTOとPRCSGは、JIAの患者教育/啓蒙に重要な役割を果たしています。

JIAの治療には、FDA(米国食品医薬品局)やEMA(欧州医薬品庁)が承認された薬が使用されます。メソトレキサート(methotrexate)は、JIAの治療に広く使用されている薬です。

JIAの患者は、定期的な検診を受けることが重要です。また、病状の悪化や副作用の発生を早期に発見し、医師に報告することが重要です。

3.6 患者教育/啓蒙

NSAIDs NSAIDs
MTX MTX
2000 PRINTO PRES
JIA JIA

3.7

JIA 6-12 JIA

3.8 1

ANA 3

3.9

JIA 40% 8-10 JIA
IL-6 IL-1
RF JIA RF

