



---

NSAIDs  
NSAIDs  
NSAIDs

3-4

NSAIDs  
NSAIDs

**Methotrexate**

methotrexate  
15mg/m2  
1  
methotrexate  
(GOT)  
methotrexate  
methotrexate

methotrexate  
methotrexate

JIA  
A  
JIA  
JIA

" "

---

**■**

methotrexate TNF 1 6 JIA methotrexate JIA

**■TNF**

TNF TNF TNF methotr exate JIA TNF JIA TNF IL-1 IL-6 TNF methotrexate

**■CTL4**

T methotrexate JIA

**■IL-1 IL-6**

JIA JIA IL-1 IL-6 JIA methotrexate TNF JIA methotrexate

**■**

**■**

**■**

( ) methotrexate

---

---

### 3.3 患者教育/啓蒙

患者教育/啓蒙は、患者が適切な治療を受け、病状を管理し、生活の質を向上させるために重要です。患者は、医師の指示に従い、薬を正しく服用し、定期的な検査を受ける必要があります。また、病状の悪化や副作用の発生を早期に発見するために、患者は症状の変化を注意深く観察し、医師に報告する必要があります。

### 3.4 治療の選択

治療の選択は、患者の病状の重症度、合併症の有無、既往症、アレルギー反応、および患者の嗜好性を考慮して決定されます。非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs)は、疼痛と炎症を軽減するために広く使用されます。メトトレキサート(methotrexate)は、関節炎の炎症を抑制するために使用されます。TNF阻害薬は、メトトレキサートで効果が不十分な患者に使用されます。

### 3.5 患者教育/啓蒙の重要性

患者教育/啓蒙は、患者が病状を適切に管理し、生活の質を向上させるために重要です。患者は、医師の指示に従い、薬を正しく服用し、定期的な検査を受ける必要があります。また、病状の悪化や副作用の発生を早期に発見するために、患者は症状の変化を注意深く観察し、医師に報告する必要があります。

15歳未満の小児は、関節炎(JIA)を発症する可能性があります。小児は、適切な治療を受け、病状を管理し、生活の質を向上させるために重要です。患者は、医師の指示に従い、薬を正しく服用し、定期的な検査を受ける必要があります。また、病状の悪化や副作用の発生を早期に発見するために、患者は症状の変化を注意深く観察し、医師に報告する必要があります。

PRINTO(www.printo.it)は、50以上の国で関節炎(JIA)に関する情報を提供しています。PRCSG(www.prcsg.org)は、関節炎(JIA)に関する情報を提供しています。FDA(EMA)は、関節炎(JIA)に関する情報を提供しています。メトトレキサート(methotrexate)は、関節炎(JIA)の炎症を抑制するために使用されます。TNF阻害薬は、メトトレキサートで効果が不十分な患者に使用されます。

### 3.6 患者教育/啓蒙の重要性

---

NSAIDs NSAIDs  
MTX MTX  
2000 PRINTO PRES  
JIA JIA

### 3.7

JIA 6-12 JIA

### 3.8

ANA 3  
RF

### 3.9

JIA 40%  
8-10 JIA  
IL-6 IL-1  
RF

