
1.6 JIA

JIA
JIA 16 6 JIA
6 JIA
JIA
JIA
JIA

1.7

JIA
" " 1
X

2. JIA

2.1

JIA JIA 6 JIA

2.1.1 JIA

JIA
JIA 5 5
JIA JIA 10%

2.1.2 JIA

6 5 5 RF JIA

RF RF JIA
RF JIA JIA 5% RF
10
RF JIA JIA 15-20%
RF JIA JIA 15-20%
RF JIA JIA 15-20%

2.1.3 JIA

JIA JIA 50% 6 5
6 5 5
5
6
JIA ANA
3

2.1.4

5 5

2.1.5

JIA
HLA-B27 6

NSAIDs (NSAIDs) are used to reduce pain and inflammation in patients with rheumatoid arthritis (RA). They are also used to treat osteoarthritis (OA) and ankylosing spondylitis (AS). NSAIDs are also used to treat other conditions such as gout, menstrual pain, and migraines.

NSAIDs (NSAIDs).
NSAIDs are used to reduce pain and inflammation in patients with rheumatoid arthritis (RA). They are also used to treat osteoarthritis (OA) and ankylosing spondylitis (AS). NSAIDs are also used to treat other conditions such as gout, menstrual pain, and migraines.

NSAIDs are used to reduce pain and inflammation in patients with rheumatoid arthritis (RA). They are also used to treat osteoarthritis (OA) and ankylosing spondylitis (AS). NSAIDs are also used to treat other conditions such as gout, menstrual pain, and migraines.

NSAIDs are used to reduce pain and inflammation in patients with rheumatoid arthritis (RA). They are also used to treat osteoarthritis (OA) and ankylosing spondylitis (AS). NSAIDs are also used to treat other conditions such as gout, menstrual pain, and migraines.

Methotrexate (Methotrexate)
Methotrexate is used to reduce pain and inflammation in patients with rheumatoid arthritis (RA). It is also used to treat other conditions such as psoriasis, psoriatic arthritis, and certain types of cancer. Methotrexate is also used to treat certain types of leukemia and lymphoma.

Methotrexate is used to reduce pain and inflammation in patients with rheumatoid arthritis (RA). It is also used to treat other conditions such as psoriasis, psoriatic arthritis, and certain types of cancer. Methotrexate is also used to treat certain types of leukemia and lymphoma.

Methotrexate is used to reduce pain and inflammation in patients with rheumatoid arthritis (RA). It is also used to treat other conditions such as psoriasis, psoriatic arthritis, and certain types of cancer. Methotrexate is also used to treat certain types of leukemia and lymphoma.

JIA 2019 年 12 月 1 日 至 2020 年 11 月 30 日 止 的 治 疗 效 果 显 著 提 升 了 患 者 的 生 活 质 量 。

3.6 非甾体抗炎药 (NSAIDs)

NSAIDs 是 治 疗 JIA 的 常 用 药 物 ， 可 有 效 缓 解 疼 痛 和 炎 症 ， 但 存 在 一 些 副 作 用 ， 如 胃 肠 道 不 适 和 肝 脏 功 能 异 常 。 MTX 是 一 种 慢 性 疾 病 改 善 治 疗 ， 可 有 效 减 轻 疼 痛 和 炎 症 ， 但 存 在 一 些 副 作 用 ， 如 肝 脏 功 能 异 常 和 骨 质 疏 松 。 MTX 可 与 NSAIDs 联 用 ， 以 达 到 更 好 的 治 疗 效 果 。 2000 年 的 PRINTo 研 究 表 明 ， MTX 与 NSAIDs 联 用 可 有 效 改 善 JIA 患 者 的 生 活 质 量 。

3.7 甲氨蝶呤 (MTX)

MTX 是 一 种 慢 性 疾 病 改 善 治 疗 ， 可 有 效 减 轻 疼 痛 和 炎 症 ， 但 存 在 一 些 副 作 用 ， 如 肝 脏 功 能 异 常 和 骨 质 疏 松 。 6-12 周 的 治 疗 可 有 效 改 善 JIA 患 者 的 生 活 质 量 。

3.8 阿那托林 (ANA) 1 号 治 疗 方 案

ANA 1 号 治 疗 方 案 是 一 种 慢 性 疾 病 改 善 治 疗 ， 可 有 效 减 轻 疼 痛 和 炎 症 ， 但 存 在 一 些 副 作 用 ， 如 肝 脏 功 能 异 常 和 骨 质 疏 松 。 3 周 的 治 疗 可 有 效 改 善 JIA 患 者 的 生 活 质 量 。

3.9 非甾体抗炎药 (NSAIDs) 和 甲氨蝶呤 (MTX) 的 联 用 治 疗 方 案

NSAIDs 和 MTX 的 联 用 治 疗 方 案 是 一 种 慢 性 疾 病 改 善 治 疗 ， 可 有 效 减 轻 疼 痛 和 炎 症 ， 但 存 在 一 些 副 作 用 ， 如 肝 脏 功 能 异 常 和 骨 质 疏 松 。 40% 的 患 者 在 8-10 周 的 治 疗 后 可 有 效 改 善 JIA 患 者 的 生 活 质 量 。

JIA
IL-6
IL-1
RF
RF
RF
JIA
RF
JIA
1/4
JIA
RF
JIA
JIA
RF
JIA
JIA
methotrexate

3.10

JIA

4.

4.1

JIA

4.2

JIA

4.3

JIA

