



<https://printo.it/pediatric-rheumatology/TW/intro>

Il presente documento è un prodotto del progetto PRINTO, finanziato dalla Commissione Europea, nell'ambito del programma di lavoro europeo per la ricerca in pediatria (PFAPA).

1. PFAPA

1.1 Definizione di PFAPA

Il PFAPA (Periodic fever, aphthous stomatitis, pharyngitis and adenitis) è una malattia infiammatoria sistemica ricorrente, caratterizzata da febbri ricorrenti, ulcere orali, faringite e adenite. La malattia fu descritta per la prima volta nel 1987 da Marshall e colleghi.

1.2 Epidemiologia

Il PFAPA è una malattia rara, che colpisce principalmente i bambini di età compresa tra i 3 e i 6 anni.

1.3 Sintomatologia

Le manifestazioni cliniche del PFAPA sono ricorrenti e comprendono febbri febbrili, ulcere orali, faringite e adenite. Le crisi durano tipicamente da 3 a 6 giorni e si ripresentano periodicamente.

1.4 Diagnosi

La diagnosi di PFAPA è basata sulla storia clinica e sui sintomi ricorrenti.

1.5 Trattamento

Il trattamento del PFAPA è sintomatico e si basa sull'uso di farmaci antinfiammatori non steroidei (FANS).

1.6 Prognosi

Il PFAPA è una malattia benigna e autolimitante, che si risolve spontaneamente entro i 6 anni di età. Tuttavia, in alcuni casi, la malattia può persistere fino a 3-6 anni di età.

