



<https://printo.it/pediatric-rheumatology/TW/intro>

Il corso è organizzato in moduli, il primo dei quali **PFAPA** è dedicato ai bambini con

## 1. PFAPA

### 1.1 Definizione di PFAPA

Il PFAPA è una malattia recidivante caratterizzata da episodi di febbre alta, eruzione cutanea, adenopatia e artrite. Il nome deriva dalle iniziali delle sue caratteristiche: Periodic fever, Aphthous stomatitis, Pharyngitis and Adenitis. Il termine fu coniato nel 1987 da Marshall e si riferisce a

### 1.2 Sintomatologia

Il PFAPA si manifesta con episodi di febbre alta, eruzione cutanea, adenopatia e artrite.

### 1.3 Epidemiologia

Il PFAPA è una malattia rara che colpisce principalmente bambini di età compresa tra i 3 e i 6 anni. La prevalenza è stimata essere compresa tra il 0,1% e il 0,2% della popolazione pediatrica.

### 1.4 Diagnosi

La diagnosi di PFAPA si basa sulla presenza di episodi ricorrenti di febbre alta, eruzione cutanea, adenopatia e artrite.

### 1.5 Differenziazione

Il PFAPA deve essere differenziato da altre malattie che possono presentare sintomi simili, come la malattia di Still, la leishmaniosi e la tubercolosi.

### 1.6 Trattamento

Il trattamento del PFAPA è sintomatico e si basa sull'uso di farmaci antipiretici e analgesici. In alcuni casi, il trattamento con corticosteroidi può essere necessario per controllare i sintomi. La malattia tende a remettere spontaneamente entro i 6-7 anni di età.



---

### 3.1

### 3.2

### 3.2

### 3.4

### 3.5

### 3.6

### 3.7