
非類固醇消炎藥 (NSAIDs)

非類固醇消炎藥 (NSAIDs) 包括：(Naproxen) (Diclofenc) (Ibuprofen) 等。這些藥物用於緩解疼痛和炎症。

用法

請按照醫生的指示服用。通常建議在飯後服用，並用大量水送服。如果出現胃痛、消化不良或嘔吐等副作用，應立即停止服用並諮詢醫生。

副作用

非類固醇消炎藥 (Sulfasalazine)

非類固醇消炎藥 (Sulfasalazine) 是一種用於治療炎症性腸病的藥物。副作用包括：(Sulfasalazine) (methotrexate) (leflunomide) 等。副作用包括：胃痛、消化不良、嘔吐、腹瀉、頭痛、發燒、皮疹、過敏反應等。

用法

請按照醫生的指示服用。通常建議在飯後服用，並用大量水送服。如果出現胃痛、消化不良或嘔吐等副作用，應立即停止服用並諮詢醫生。

副作用

副作用包括：胃痛、消化不良、嘔吐、腹瀉、頭痛、發燒、皮疹、過敏反應等。

用法

請按照醫生的指示服用。通常建議在飯後服用，並用大量水送服。

副作用

副作用包括：胃痛、消化不良、嘔吐、腹瀉、頭痛、發燒、皮疹、過敏反應等。

2.5 非類固醇消炎藥

非類固醇消炎藥 (Sulfasalazine)

非類固醇消炎藥 (Sulfasalazine) 是一種用於治療炎症性腸病的藥物。副作用包括：胃痛、消化不良、嘔吐、腹瀉、頭痛、發燒、皮疹、過敏反應等。

非類固醇消炎藥 (Sulfasalazine) 是一種用於治療炎症性腸病的藥物。副作用包括：胃痛、消化不良、嘔吐、腹瀉、頭痛、發燒、皮疹、過敏反應等。

