



www.printo.it/pediatric-rheumatology/UA/intro

Медикаментозна терапія

Версія 2016

10. Сульфасалазин

10.1 Опис

Сульфасалазин створений в результаті поєднання антибактеріального та протизапального препарату. Його створили багато років тому, коли вважалося, що ревматоїдний артрит у дорослих є інфекційною хворобою. Незважаючи на те, що обґрунтування його використання згодом виявилось неправильним, ефективність сульфасалазину показана при деяких формах артриту і для групи захворювань, які проявляються хронічним запаленням кишечника.

10.2 Дозування/Спосіб застосування

Сульфасалазин призначається перорально 50 мг/кг/день, максимально 2 г/день

10.3 Побічні ефекти

Побічні ефекти не є рідкими, і вимагають періодичної перевірки аналізів крові. Вони включають шлунково-кишкові розлади (анорексія, нудота, блювота та діарея), алергічний висип на шкірі, токсичне ураження печінки (підвищення трансаміназ), зменшення кількості циркулюючих клітин крові, зменшення концентрації імуноглобуліну в сироватці крові.

Цей препарат протипоказаний для пацієнтів із системним ЮІА або ЮСЧВ, оскільки він може викликати тяжке загострення хвороби або синдром активації макрофагів.

10.4 Основні покази у дитячій ревматології
Ювенільний ідіопатичний артрит (в основному ентезит-асоційований ЮІА).