



<https://printo.it/pediatric-rheumatology/UA/intro>

## **Медикаментозна терапія**

Версія 2016

### **2. Циклоспорин А**

#### **2.1 Опис**

Циклоспорин А є імуносупресивним препаратом, який первинно використовували для запобігання відторгнення органів після операції з пересадки, але зараз цей препарат використовують для лікування дитячих ревматологічних хвороб. Цей препарат є потужним інгібітором групи білих клітин крові, що грають провідну роль у формуванні імунної відповіді.

#### **2.2 Дозування/Спосіб застосування**

Використовується у формі рідини чи таблетовано, в дозі 3-5 мг/кг/добу розділеної на два прийоми

#### **2.3 Побічні ефекти**

Побічні ефекти є досить частими, особливо у високих дозах, і можуть бути причиною обмеження використання препарату. Вони включають ушкодження нирок, підвищення тиску крові, ушкодження печінки, розростання ясен, надмірне оволосіння тіла, нудоту та блювоту.

Відповідно, лікування циклоспорином потребує регулярних оглядів лікаря і аналізів для оцінки розвитку побічних ефектів. Дітям потрібно регулярно вимірювати тиск вдома.

#### **2.4 Основні покази у дитячій ревматології**

---

Синдром активації макрофагів

Ювенільний дерматоміозит